

IT3120121 CARBONARE

Conservare il complesso mosaico di prati mesofili, umidi e palustri che ospita alcune rarità floristiche come *Crepis mollis* (EN) e *Carex disticha* (EN) riportandolo, dove compromesso (costruzione del depuratore e/o abbandono) ad un migliore stato di conservazione. Di rilievo la presenza di *Crex crex* (re di quaglie) anche nell'area esterna al sito.

| MISURE DI CONSERVAZIONE | HABITAT INTERESSATI | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------|
| | 6410 6430 7230 | 6210 6510 6520 | 9180 91E0 |
| Evitare gli interventi, bonifica e drenaggio. | X | | X |
| Evitare gli inquinamenti derivanti da concimazioni artificiali. | X | | X |
| Regolamentare lo sfalcio e il pascolamento affinché siano equilibrati per la tipologia di habitat e di tipo tradizionale. | X | X | |
| Ridurre le concimazioni e l'accumulo di letame. | | X | |
| Incentivare gli sfalci (con esportazione della biomassa) il cui numero non sia superiore ad un taglio l'anno seguito eventualmente da un turno di pascolo. | A | A | |
| Contenere le invasioni legnose nelle aree palustri tramite sfalcio, decespugliamento e taglio resinose (nel periodo autunnale) con asportazione della biomassa. | A | | |

| MISURE DI CONSERVAZIONE | SPECIE INTERESSATE | |
|--|-----------------------|--------------------|
| | CREX CREX | LANIUS COLLURIO |
| Limitare l'uso di pesticidi, facendo eventualmente utilizzare pesticidi selettivi e a bassa tossicità acuta e cronica. | X | X |
| Eeguire lo sfalcio tardivo dei prati incentivando le operazioni a bassa velocità partendo dal centro degli appezzamenti e proseguendo con direzione centrifuga; prevedendo inoltre dei sistemi di allontanamento dei selvatici ad esempio tramite l'applicazione delle cosiddette "barre d'involo". | A | |
| Prevedere nelle situazioni di semi-abbandono, particolarmente in presenza di vegetazione nitro-igrofila, sfalci saltuari tardivi con cadenza pluriennale. | A | A |
| Incentivare quelle pratiche che evitino l'infeltrimento della cotica e la successiva sostituzione con formazioni arbustive. | A | A |
| Incentivare una gestione agricola semi-estensiva che garantisca una diversificazione del paesaggio agrario (mantenere la presenza di zone prative e agricole interrotte da siepi, cespugli e alberi sparsi). | A | A |
| Mantenere e/o ripristinare le zone umide, le paludi, le torbiere e i boschi igrofilo. | A | B |